



ویکسین

یہ مدافعتی نظام کو وائرس کے اس حصے کو پہچاننے اور روکنے میں مدد کرتی ہیں جو کووڈ ۱۹ کا سبب بنتا ہے ، جو ہمارے جسم میں اسکو بڑھوتری سے روکتا ہے۔

یورپ میں مختلف قسم کی ویکسینوں کے استعمال کی اجازت ہے:

اگرچہ وہ مختلف طریقے سے کام کرتی ہیں ،

!! ہر ایک اپنی حفاظت میں مدد کرتی ہے

یہ کیوں لگائی جاتی ہیں

کیونکہ یہ شدید قسم کی شکلیں اور ہیت پیدا کرنے سے روکتی ہیں

کیونکہ یہ ہمارے ملک کے تمام لوگوں کا حق ہیں اور کیونکہ آبادی کے تحفظ کے لئے یہ ضروری ہیں اگرچہ لازمی نہیں ہے۔

اس کو کیسے منظم بنایا جاتا ہے

زیادہ تر ویکسین 2 خوراک میں دی جاتی ہے ، کئی ہفتوں کے فاصلے کے بعد بھی۔ تحفظ مکمل ہونے کے لئے ، دونوں خوراکیں وصول کرنا ضروری ہے

ویکسین کے بعد کیا ہوتا ہے ؟

ویکسین کے فوراً بعد ہی ہمیں فوری رد عمل کی جانچ کرنے کے لئے 15-30 منٹ انتظار کرنے کو کہا جائے گا۔

ویکسین کے بعد آنے والے دنوں میں ، ضمنی اثرات کا ہونا معمول ہے ، اس کا مطلب یہ ہے کہ مدافعتی دفاع چالو ہو رہا ہے

سب سے عام ضمنی اثرات ہلکے اور 1 یا 2 دن کے بعد غائب ہوجاتے ہیں: انجکشن والی جگہ میں لالی ، درد ، تھکاوٹ ، سر درد ، پٹھوں میں درد ، اور بخاروغی

اگر یہ علامات 3 دن سے زیادہ برقرار رہتی ہیں یا اگر آپ کو غیر متوقع مضر اثرات ہیں تو اپنے فیملی ڈاکٹر یا اے یو ایس ایل کو فون کریں۔

ہنگامی صورت حال میں ، ہمیشہ 118 پر کال کریں یا ایمرجنسی روم میں جائیں۔

کیا تحفظ انجیکشن کے فوراً بعد موثر ہے؟

نہیں: دوسری خوراک (2 خوراک کی صورت میں) سے 2 ہفتوں کے بعد یا ایک خوراک سے دو ہفتوں کے بعد مکمل افادیت کو موثر سمجھا جاتا ہے

ویکسین کے بعد کیا کرنا ہے

انسداد کوویڈ ۱۹ کے تمام حفاظتی اقدامات کا احترام کرنا ضروری ہے: ماسک کو صحیح طریقے سے پہنیں (جس میں ناک اور منہ کا احاطہ ہوتا ہے) قومی دفعات کے مطابق ضروری ہے ، کم از کم 1 میٹر کا باہمی فاصلہ برقرار رکھیں ، ہجوم سے بچیں اور اکثر اپنے ہاتھ صابن اور پانی یا ہائیڈرو الکحل کے ساتھ۔ دھوئیں ۔

!ویکسین لگوانے کا شکریہ ، اپنے آپ کی اور ہم سب کی حفاظت کریں


