

ভার্সন ০২, ২০.০৪.২০২১

কোভিড -১৯ ভ্যাকসিন সম্মতি ফর্মের সংযুক্তি

সাধারণ তথ্য

COMIRNATY(বায়োএনটেক/ফাইজার)

Comirnaty কি এবং এটি কিসের জন্য

Comirnaty হল একটি ভ্যাকসিন যা কোভিড-১৯ প্রতিরোধে ব্যবহৃত হয়, যা SARS-CoV-2 ভাইরাসের দ্বারা সৃষ্ট একটি রোগ। Comirnaty প্রাপ্ত বয়স্ক এবং ১৬ বছর বা তার বেশি বয়সী কিশোর-কিশোরীদের দেওয়া হয়। এই ভ্যাকসিন দেহের প্রতিরোধ ব্যবস্থা (দেহের প্রাকৃতিক প্রতিরক্ষা) কে ভাইরাসের বিরুদ্ধে অ্যান্টিবডি এবং সক্রিয় রক্তকণিকা তৈরি করতে প্রভাবিত করে, যারফলে এটি কোভিড -১৯ এর বিরুদ্ধে সুরক্ষা দেয়। যেহেতু Comirnaty সংশ্লিষ্ট ভাইরাসের উপস্থিতি ছাড়াই দেহের প্রতিরোধ ব্যবস্থাকে প্রভাবিত করে, তাই এটি কোভিড-১৯ সংক্রমণ করতে পারে না।

Comirnaty গ্রহণের পূর্বে আপনার যা জানা প্রয়োজন

যদি এই ভ্যাকসিনের সক্রিয় উপাদান বা অন্য কোন উপাদানে (নীচে তালিকাভুক্ত) আপনার অ্যালার্জি থাকে তবে Comirnaty দেওয়া উচিত নয়।

সতর্কীকরণ এবং সাবধানতা

ভ্যাকসিন গ্রহণের আগে আপনার ডাক্তার বা ভ্যাকসিন কেন্দ্রে স্বাস্থ্যসেবা কর্মীর সাথে যোগাযোগ করুন, যদি:

- অন্য কোন ভ্যাকসিন গ্রহণের পর বা অতীতে Comirnaty গ্রহণের পর আপনার মারাত্মক অ্যালার্জি বা শ্বাস-প্রশ্বাসের সমস্যা হয়েছিল;
- আপনি ইঞ্জেকশনের পরে অজ্ঞান হয়েছেন;
- আপনার কোন গুরুতর অসুস্থতা বা তীব্র সংক্রমণ জ্বর থাকে। তবে, আপনার যদি হালকা জ্বর বা ফুস্ফুসের সংক্রমণ থাকে (যেমন সর্দি) আপনি এখনও টিকা গ্রহণ করতে পারেন;
- আপনার রক্তক্ষরণের সমস্যা থাকে, রক্ত জমে কালশিটে হওয়ার প্রবণতা থাকে বা রক্ত জমাট বাঁধা প্রতিরোধে যদি ওষুধ ব্যবহার করেন;
- এইচআইভির মতো কোন রোগের কারণে বা কর্টিকোস্টেরয়েডের মতো ওষুধ যা প্রতিরোধ ব্যবস্থা আক্রান্ত করে এমন ওষুধ গ্রহণের ফলে আপনার দুর্বল প্রতিরোধ ক্ষমতা রয়েছে।

অন্যান্য ওষুধ এবং Comirnaty

আপনি সম্প্রতি ব্যবহার করছেন বা ব্যবহার করার সম্ভাবনা রয়েছে যে কোন ওষুধ বা সম্প্রতি আপনাকে অন্য কোন ভ্যাকসিন প্রয়োগ করা হয়ে থাকলে তা ভ্যাকসিনেশন সেন্টারস্থ আপনার ডাক্তার বা স্বাস্থ্যসেবা কর্মীকে বলুন।

গর্ভাবস্থা এবং বুকের দুধ খাওয়ানো

আপনি যদি গর্ভবতী হন, সন্দেহ হয় বা গর্ভবতী হওয়ার পরিকল্পনা করেন বা বুকের দুধ পান করান তবে এই ভ্যাকসিন গ্রহণের আগে আপনার প্রাথমিক / পারিবারিক ডাক্তারের সাথে পরামর্শ করুন।

গর্ভবতী মহিলাদের মধ্যে Comirnaty ব্যবহারের তথ্য সীমিত। প্রাণীর উপর করা ভ্যাকসিনের অধ্যয়ন / রিসার্চ গর্ভাবস্থা, ভ্রূণ / ভ্রূণের বিকাশ, প্রসব, বা প্রসবোত্তর বিকাশের উপর কোন প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ ক্ষতিকারক প্রভাব নির্দেশ করে না। গর্ভাবস্থায় Comirnaty প্রয়োগ কেবল তখনই বিবেচনা করা উচিত যখন সম্ভাব্য সুবিধাগুলি মা এবং ভ্রূণের জন্য সম্ভাব্য ঝুঁকির চেয়েও বেশী হয়।

সুরক্ষার সময়কাল এবং ভ্যাকসিন কার্যকারিতার সীমাবদ্ধতা

ভ্যাকসিন দ্বারা প্রদত্ত সুরক্ষার সময়কাল জানা যায় না; যা প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে ক্লিনিকাল ট্রায়ালগুলি এখনও চলছে। অন্যান্য সকল ভ্যাকসিনের মত Comirnaty ভ্যাকসিন দেওয়ার ফলে এটি সকলকেই সুরক্ষা দিতে পারে না। ভ্যাকসিনের দ্বিতীয় ডোজের ৭ দিন পর্যন্ত কোন ব্যক্তিই সম্পূর্ণরূপে সুরক্ষিত বলে বিবেচিত হয় না।

অতএব, জনস্বাস্থ্য সুরক্ষার সুপারিশগুলি (মুখোশ, সামাজিক দূরত্ব এবং ঘন ঘন হাত ধোয়া) কঠোরভাবে অনুসরণ করা অব্যাহত রাখতে হবে।

ভার্সন ০২, ২০.০৪.২০২১

Comirnaty কিভাবে প্রয়োগ করা হয়

Comirnaty বাহুর উপরের অংশে ইন্ট্রামাসকুলার ইনজেকশন হিসাবে পাতলা মিশ্রনের মাধ্যমে প্রয়োগ করা হয়। এর একটি বুস্টার ডোজ নির্ধারিত আছে এবং দ্বিতীয় ডোজটি ভ্যাকসিন সাইকেল সম্পূর্ণ করার জন্য প্রথম ডোজের ৩ সপ্তাহ (তবে কোনভাবেই ৪২ দিনের বেশি পরে নয়) পরে নেওয়ার পরামর্শ দেওয়া হয়।

এটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ যে সর্বোত্তম প্রতিরোধ ক্ষমতা অর্জনের জন্য দ্বিতীয় ডোজ নেওয়া প্রয়োজনীয়। আপনি যদি দ্বিতীয় ডোজের জন্য নির্ধারিত তারিখে যেতে ভুলে যান তবে আপনার প্রাথমিক / পারিবারিক ডাক্তার বা টিকা কেন্দ্রের সাথে যোগাযোগ করুন যেখানে প্রথম ডোজ দেওয়া হয়েছিল।

সম্ভাব্য পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া

অন্যান্য সকল ভ্যাকসিনের মত, Comirnaty প্রয়োগের ফলে পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া হতে পারে, যদিও সকলের মধ্যে তা নাও হতে পারে।

অতি সাধারণ পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া (প্রতি ১০ জনের মধ্যে ১ জনেরও বেশির মধ্যে হতে পারে):

- ইনজেকশন স্থান: ব্যথা, ফুলে যাওয়া
- ক্লান্তি
- মাথাব্যথা
- পেশী ব্যথা
- শীত অনুভূত হওয়া
- জয়েন্ট ব্যথা
- ডায়রিয়া
- জ্বর

সাধারণ পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া (প্রতি ১০ জনের মধ্যে ১ জনের পর্যন্ত হতে পারে):

- ইনজেকশন স্থানে লালচে হওয়া
- বমি বমি ভাব
- বমি করা

অস্বাভাবিক পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া (১০০ জনের মধ্যে ১ জনের পর্যন্ত হতে পারে):

- লিম্ফ নোড বৃদ্ধি পাওয়া
- হতাশার অনুভূতি
- শরীরে ব্যথা
- অনিদ্রা
- ইনজেকশন স্থানে চুলকানি
- অ্যালার্জি প্রতিক্রিয়া, যেমন ফুসকুড়ি বা চুলকানি

বিরল পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া (১০০০ জনের মধ্যে ১ জনের পর্যন্ত হতে পারে):

- মুখের একপাশে অস্থায়ী অসামঞ্জস্যতা
- অ্যালার্জি যেমন মুখের দাগ বা মুখ ফুলে যাওয়া

জানা নেই (উপলব্ধ ডেটার ভিত্তিতে ফ্রিকোয়েন্সি পুনরাবৃত্তি নির্ণয় করা যায় না): গুরুতর অ্যালার্জির প্রতিক্রিয়া।

যদি আপনার কোন পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া হয়, এমনকি উপরে তালিকাভুক্ত না হলেও, আপনার ডাক্তারের সাথে বা আপনার ভ্যাকসিন কেন্দ্রের সাথে যোগাযোগ করুন।

নিম্নোক্ত ওয়েবসাইটে জাতীয় রিপোর্টিং সিস্টেমের মাধ্যমেও আপনি সরাসরি পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া সম্বন্ধে রিপোর্ট করতে পারেন (<https://www.aifa.gov.it/content/segnalazioni-reazioni-avverse>).

Comirnaty যেসকল উপাদানে তৈরি

সক্রিয় উপাদান হল অ্যান্টি-কোভিড -১৯ এমআরএনএ ভ্যাকসিন।

অন্যান্য উপাদানগুলি হল: ((৪-হাইড্রোক্সিবিউটেল) আজনেডিল) বিস (হেক্সেন-৬,১-ডায়াইল) বিস (২-হেক্সিলেডেকানোয়েট) (এএলসি-০৩১৫); ২ - [[পলিইথিলিন গ্লাইকোল] -২০০০] -এন, এন-ডাইটেট্রাডেসাইলেসটাইমাইড (এএলসি-০১৫৯); ১,২-ডিস্টেরোয়েল-এসএন-গ্লিসারো -৩-ফসফোকোলিন (ডিএসপিপি); কোলেস্টেরল; পটাশিয়াম ক্লোরাইড; পটাশিয়াম ডাইহাইড্রোজেন ফসফেট; সোডিয়াম ক্লোরাইড; ডিসোডিয়াম ফসফেট ডিহাইড্রেট; সুক্রোজ; ইনজেকশনে ব্যবহার যোগ্য পানি।